

## CONSULTA PÚBLICA Nº 726, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

**O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária**, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto na Portaria nº 211, de 6 de fevereiro de 2017, e no art. 44, VIII, aliado ao art. 53, III, do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve submeter à consulta pública, para comentários e sugestões do público em geral, proposta de ato normativo, em Anexo.

Art. 1º Fica estabelecido o prazo de 45 dias (quarenta e cinco) dias para envio de comentários e sugestões ao texto da Instrução Normativa que define a Lista de Medicamento Isentos de Prescrição, conforme Anexo.

Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo terá início 7 (sete) dias após a data de publicação desta Consulta Pública no Diário Oficial da União.

Art. 2º A proposta de ato normativo estará disponível na íntegra no portal da Anvisa na internet e as sugestões deverão ser enviadas eletronicamente por meio do preenchimento de formulário específico, disponível no endereço: [http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id\\_aplicacao=50605](http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=50605).

§1º As contribuições recebidas são consideradas públicas e estarão disponíveis a qualquer interessado por meio de ferramentas contidas no formulário eletrônico, no menu “resultado”, inclusive durante o processo de consulta.

§2º Ao término do preenchimento do formulário eletrônico será disponibilizado ao interessado número de protocolo do registro de sua participação, sendo dispensado o envio postal ou protocolo presencial de documentos em meio físico junto à Agência.

§3º Em caso de limitação de acesso do cidadão a recursos informatizados será permitido o envio e recebimento de sugestões por escrito, em meio físico, durante o prazo de consulta, para o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Gerência de Avaliação de Segurança e Eficácia (GESEF/GGMED), SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050.

§4º Excepcionalmente, contribuições internacionais poderão ser encaminhadas em meio físico, para o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Assessoria de Assuntos Internacionais – AINTE, SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050.

Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promoverá a análise das contribuições e, ao final, publicará o resultado da consulta pública no portal da Agência.

Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e razões de conveniência e oportunidade, articular-se com órgãos e entidades envolvidos com o assunto, bem como aqueles que tenham manifestado interesse na matéria, para subsidiar posteriores discussões técnicas e a deliberação final da Diretoria Colegiada.

FERNANDO MENDES GARCIA NETO



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Mendes Garcia Neto, Diretor**, em 19/09/2019, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>.



informando o código verificador **0741308** e o código CRC **70B80243**.

## **ANEXO PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA**

Processo nº: 25351.915906/2019-90

Assunto: Proposta de Instrução Normativa que define a Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição, em atendimento à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 98, de 1º de agosto de 2016.

Agenda Regulatória 2017-2020: item 7.23 Atualização da Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (LMIP)

Área responsável: Gerência de Avaliação de Segurança e Eficácia (GESEF/GGMED)

### **AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

#### **MINUTA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN**

#### **INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº [Nº], DE [DIA] DE [MÊS POR EXTENSO] DE [ANO]**

Define a Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 15, III e IV, aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, V, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve adotar a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, conforme deliberado em reunião realizada em **XX de XX de 201...**, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

#### **CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES INICIAIS**

Art. 1º Esta Instrução Normativa define a relação dos medicamentos enquadrados pela Anvisa como isentos de prescrição, na forma das Listas de Medicamentos Isentos de Prescrição (LMIP) para medicamentos sintéticos e biológicos ou para medicamentos fitoterápicos, Anexos I e II, respectivamente, desta Instrução Normativa, em atendimento à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 98, de 1º de agosto de 2016.

Parágrafo único. Medicamentos isentos de prescrição são os medicamentos que podem ser dispensados sem exigência de prescrição.

#### **CAPÍTULO II ORGANIZAÇÃO DA LMIP - SINTÉTICOS E BIOLÓGICOS**

Art. 2º A LMIP para o medicamentos sintéticos e biológicos é organizada em ordem alfabética dos insumos farmacêuticos ativos (IFAs) e seus respectivos: subgrupo terapêutico ou subgrupo farmacológico, forma(s) farmacêutica(s), concentração máxima para cada forma farmacêutica e indicação(ões) terapêutica(s), que, juntos, configuram o Medicamento Isento de Prescrição.

§ 1º Os subgrupos terapêuticos ou subgrupos farmacológicos de cada IFA são classificados conforme o Sistema de Classificação Anatômica Terapêutica Química (**Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System**), recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

§ 2º Os medicamentos com o mesmo IFA (ou associação), forma farmacêutica, indicação(ões) terapêutica(s) e com concentração igual ou inferior àqueles indicados na LMIP são classificados como isentos de prescrição.

### CAPÍTULO III ORGANIZAÇÃO DA LMIP - FITOTERÁPICOS

Art. 3º A LMIP para medicamentos fitoterápicos é organizada em ordem alfabética das espécies e suas respectivas: classe terapêutica, parte empregada e indicação(ões) terapêutica(s) que, juntos, configuram o Fitoterápico Isento de Prescrição.

Art. 4º O fitoterápico com a mesma espécie, parte empregada e indicação(ões) terapêutica(s) daquelas indicadas na LMIP para medicamentos fitoterápicos é classificado como isento de prescrição.

### CAPÍTULO IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5º Para a classificação dos medicamentos ou fitoterápicos como isentos de prescrição, cujos IFAs, formas farmacêuticas, espécies, partes empregadas ou indicações terapêuticas sejam distintas ou concentrações superiores às indicadas na LMIP, as empresas interessadas deverão submeter os códigos de petição 11190 – Solicitação de enquadramento de medicamento como isento de prescrição e 11514 – Aditamento para Farmacovigilância - enquadramento de medicamento como isento de prescrição, com as documentações estabelecidas em seus **checklists** e na Resolução – RDC nº 98, de 2016.

Art. 6º A cada atualização da LMIP, todas as empresas detentoras de registro de medicamentos ali listados deverão se adequar atendendo ao estabelecido nos artigos 11, 12 e 13 da Resolução – RDC nº 98, de 2016.

Art. 7º Revoga-se a Instrução Normativa – IN nº 11, de 29 de setembro de 2016.

Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

DIRETOR PRESIDENTE

### ANEXO I LISTA DE MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO (LMIP) Medicamentos Sintéticos e Biológicos

<b>Fármaco</b>	<b>Subgrupo terapêutico ou farmacológico</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Concentração Máxima</b>	<b>Indicação Terapêutica</b>

Acetato de hidrocortisona	D07A – Corticosteroides (isolados) de uso local	Creme dermatológico, pomada dermatológica	10 mg/g	Dermatite seborreica. Eczemas/dermatites de contato, numular (prurigo nodular, eczema discoide), disidrótico e atópico (infantil, endógeno, neurodermite). Eczemas perianal, de estase. Irritações da pele de pequena intensidade provocadas por exposição excessiva ao sol e picadas de inseto.
Acetilcisteína	R05C – Expectorantes, excluindo associações com antitussígenos V03A – Outros produtos terapêuticos	Comprimido efervescente, granulado	600 mg	Secreções mucosas densas e viscosas (catarro, muco) nas vias aéreas, decorrentes ou associadas à doenças broncopulmonares. Intoxicação por paracetamol.
		Xarope	40 mg/ml	
	R01A – Descongestionantes e outras preparações nasais de uso local	Solução nasal spray	11,5 mg/ml	Congestão nasal (nariz entupido) associada a rinites ou após procedimentos cirúrgicos no nariz.
Acetilracemtionina + citrato de colina + betaína	A05B – Terapia biliar, lipotrópicos	Solução oral	40 + 53 + 50 mg/ml	Distúrbios hepáticos (do fígado).
Ácido acetilsalicílico	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido, comprimido revestido de liberação modificada	500 mg	Febre. Dores leves a moderadas, como: cefaleia (dor de cabeça), dor de dente, dor por inflamação da garganta, lombalgia (dor nas costas), mialgia (dor muscular), artralgia (dor de artrite, dor nas articulações) e as associadas à dismenorreia (cólicas menstruais) e gripes e resfriados comuns.
Ácido acetilsalicílico + ácido ascórbico (Vit. C)	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido efervescente	400 + 240 mg	Febre. Dores leves a moderadas, como: cefaleia (dor de cabeça), dor de dente, dor por inflamação da garganta, lombalgia (dor nas costas), mialgia (dor muscular), artralgia (dor de artrite, dor nas articulações) e as associadas à dismenorreia (cólicas menstruais) e gripes e resfriados comuns.
Ácido acetilsalicílico +	N02B – Analgésicos e	Comprimido	400 + 200 mg	Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre e cefaleia (dor

ácido ascórbico (Vit. C)	antipiréticos			de cabeça).
Ácido acetilsalicílico + cafeína	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido	500 + 30 mg	Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre e cefaleia (dor de cabeça).
			650 + 65 mg	Dores moderadas a fortes, como cefaleias (dor de cabeça) e enxaqueca.
Ácido acetilsalicílico + maleato de clorfeniramina + cafeína	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Cápsula dura	324 + 2 + 32,4	Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, cefaleia (dor de cabeça), dor no corpo, coriza, espirros e obstrução nasal.
Ácido acetilsalicílico + maleato de dexclorfeniramina + cloridrato de fenilefrina + cafeína	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido	400 + 1 + 10 + 30 mg	Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, cefaleia (dor de cabeça), dor no corpo, coriza, espirros e obstrução nasal.
Ácido acetilsalicílico + paracetamol + cafeína	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido revestido	250 + 250 + 65 mg	Dores leves a moderadas, como cefaleia (dor de cabeça), enxaqueca, mialgias (dor muscular), artralgia (dor de artrite, dor nas articulações), dor de dente e dores associadas à dismenorreia (cólicas menstruais) e gripes e resfriados.
Ácido azelaico	D10A – Preparações antiacne de uso local	Creme dermatológico	200 mg/g	Acne vulgar.
		Gel dermatológico	150 mg/g	Acne vulgar e rosácea papulopustulosa.
Ácido benzóico + ácido salicílico + iodo metálico	D01A – Antifúngicos de uso local	Solução dermatológica	20 + 20 + 2,5 mg/ml	Micoses superficiais da pele.
Ácido bórico + ácido salicílico + enxofre + óxido de zinco	D01A – Antifúngicos de uso local	Pó dermatológico	3,0 + 0,352 + 17,602 + 11,735 g	Dermatite de fraldas (assaduras, dermatite amoniacal). Brotoeja. Desodorante e antiperspirante de pés e axilas. Prevenção de frieiras e pruridos na pele.
Ácido fólico	B03 –	Solução oral	0,2 mg/ml	Deficiência de ácido fólico. Anemia

	Antianêmicos			por deficiência de ácido fólico.
Ácido fólico + acetato de alfatocoferol (Vit. E)	B03 – Antianêmicos	Cápsula gelatinosa mole	0,8 + 20 mg	Deficiência de ácido fólico e vitamina E.
Alantoína + triclosana + óxido de zinco	D01A – Antifúngicos de uso local	Pó dermatológico	5 + 1 + 100 mg/g	Dermatite de fraldas (assaduras, dermatite amoniacal). Eczemas, brotoejas, queimaduras e outras irritações superficiais da pele. Micose nas dobras da pele (intertrigo).
Álcool polivinílico	S01X – Outros produtos oftalmológicos	Solução oftálmica	14 mg/ml	Ressecamento ocular (olho seco). Lubrificação e reumidificação de prótese ocular e durante o uso de lentes de contato convencionais (lentes rígidas acrílicas ou gás permeáveis).
Alginato de sódio + bicarbonato de potássio	A02A – Antiácidos	Suspensão oral	100 + 20 mg/ml	Regurgitação ácida (refluxo), azia (acidez e queimação estomacal) e dispepsia (dor ou desconforto no estômago devido à má digestão).
Alginato de sódio + bicarbonato de sódio + carbonato de cálcio	A02A – Antiácidos	Comprimido mastigável	250 + 133,5 + 80 mg	Azia (acidez e queimação estomacal), dispepsia (dor ou desconforto no estômago devido à má digestão), enjoo e vômito.
		Suspensão oral	50 + 26,7 + 16 mg/ml	
Aloína + <i>Atropa belladonna</i> + cloreto de metiltionínio + extrato seco de <i>Costus spicatus</i> + teobromina	G04B – Urológicos	Comprimido revestido	8 + 10 + 10 + 20 + 30 mg	Antisséptico das vias urinárias. Prevenção dos cálculos urinários por oxalatos.
Benzoato de benzila	P03A – Ectoparasiticidas, incluindo escabicidas	Sabonete	100 mg/g	Pediculose (piolhos e lêndeas). Escabiose (sarna).
Bicarbonato de sódio + carbonato de magnésio + carbonato de cálcio	A02A – Antiácidos	Pastilha	63,7 + 67 + 521 + 3,3 mg	Azia (acidez e queimação estomacal) e dor de estômago.

+ carbonato básico de bismuto		Granulado	586,742 + 134,34 + 134,34 + 32,495 mg/g	Regurgitação ácida (refluxo), azia (acidez e queimação estomacal), epigastralgia (dor na boca do estômago), dispepsia (dor ou desconforto no estômago devido à má digestão).
		Pó para solução oral	649 + 146,67 + 146,67 + 35,8 mg/g	
Bicarbonato de sódio + carbonato de sódio	A02A – Antiácidos	Granulado efervescente	462 + 90 mg/g	Azia (acidez e queimação estomacal) e dispepsia (dor ou desconforto no estômago devido à má digestão).
Bicarbonato de sódio + carbonato de sódio + ácido acetilsalicílico + ácido cítrico	A02A – Antiácidos	Comprimido efervescente	1854 + 400 + 325 + 1413 mg	Azia (acidez e queimação estomacal), dispepsia (dor ou desconforto no estômago devido à má digestão). Cefaleia (dor de cabeça) digestiva.
Bicarbonato de sódio + carbonato de sódio + ácido cítrico	A02A – Antiácidos	Granulado efervescente, pó efervescente	460 + 100 + 440 mg/g	Azia (acidez e queimação estomacal) e dispepsia (dor ou desconforto no estômago devido à má digestão).
Bisacodil	A06A – Laxantes	Comprimido revestido, drágea	5 mg	Constipação intestinal (prisão-de-ventre). Facilitar a evacuação em casos necessários, como no preparo do paciente para exames diagnósticos; antes ou após procedimentos cirúrgicos; e em pacientes acamados, portadores de hemorroidas ou fissuras anais.
Bisglicinato ferroso	B03 – Antianêmicos	Comprimido revestido	150 mg	Anemia por deficiência de ferro.
		Solução oral	30 mg/ml	
Bisglicinato ferroso + ácido fólico	B03 – Antianêmicos	Comprimido revestido	150 + 5 mg	Deficiência de ferro e ácido fólico, associada ou não à anemia. Prevenção de distúrbios do tubo neural, durante o período periconcepcional (3 meses antes e 3 meses após a concepção).
		Solução oral	30 + 0,2 mg/ml	
Bromidrato de dextrometorfano	R05D – Antitussígenos, excluindo	Xarope	3 mg/ml	Tosse seca (não produtiva, irritativa, sem catarro) associada a gripes e resfriados ou à inalação de agentes irritantes.

	associações com expectorantes			
Butilbrometo de escopolamina	A03B – <i>Belladonna</i> e derivados (isolados)	Comprimido revestido, drágea	10 mg	Cólicas gastrintestinal (estômago e intestinos), das vias biliares e dos órgãos sexuais e urinários.
		Solução oral	10 mg/ml	
Butilbrometo de escopolamina + dipirona	A03D – Antiespasmódicos em associação com analgésicos	Comprimido revestido	10 + 250 mg	Cólicas gastrintestinal (estômago e intestinos), das vias biliares e dos órgãos sexuais e urinários. Cólica menstruais (dismenorreia).
		Solução oral	6,667 + 333,4 mg/ml	
Butilbrometo de escopolamina + paracetamol	A03D – Antiespasmódicos em associação com analgésicos	Comprimido revestido	10 mg + 500 mg	Cólicas gastrintestinal (estômago e intestinos), das vias biliares e dos órgãos sexuais e urinários. Cólica menstruais (dismenorreia).
Calamina + cânfora + cloridrato de difenidramina	D04A – Antipruriginosos, incluindo anti-histamínicos, anestésicos e outros de uso local	Creme dermatológico, loção dermatológica	80 + 1,0 + 10 mg/ml	Irritações da pele de pequena intensidade provocadas por exposição excessiva ao sol, plantas e outros. Brotoejas. Picadas de insetos.
Cânfora	D04A – Antipruriginosos, incluindo anti-histamínicos, anestésicos e outros de uso local	Tablete dermatológico	712 mg	Irritações da pele.
Cânfora + eucaliptol + mentol + guaiacol	R05X - Outros produtos para gripe e resfriados	Bálsamo dermatológico	25 + 100 + 50 + 10 mg/g	Congestão nasal e tosse associadas a gripes e resfriados.
Carbocisteína	R05C – Expectorantes, excluindo associações com antitussígenos	Xarope	50 mg/ml	Secreções mucosas densas e viscosas (catarro, muco) nas vias aéreas, decorrentes ou associadas à doenças broncopulmonares.
Carbômer + sorbitol	S01X – Outros produtos oftalmológicos	Gel oftálmico	2 + 48,5 mg/g	Ressecamento ocular (olho seco) causado por secreção lacrimal deficiente; distúrbios funcionais resultantes de doenças locais ou



				sistêmicas; ausência ou deficiência do fechamento da pálpebra.
Carbonato de cálcio + hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio	A02A – Antiácidos	Comprimido mastigável	231,5 + 159,9 + 208,9 mg	Azia (acidez e queimação estomacal) e dispepsia (dor ou desconforto no estômago devido à má digestão).
			230 + 178 + 185 mg	Azia (acidez e queimação estomacal), epigastralgia (dor na boca do estômago), dispepsia (dor ou desconforto no estômago devido à má digestão), enjoo e vômito.
Carmelose sódica	S01X – Outros produtos oftalmológicos	Solução oftálmica	5 mg/ml	Irritação, ardor e ressecamento oculares (olho seco) causados por exposição ao vento, sol, calor, ar seco ou outro agente irritante. Lubrificação e reidratação ocular durante o uso de lentes de contato.
Carmelose sódica	S01X – Outros produtos oftalmológicos	Solução oftálmica	10 mg/ml	Ressecamento ocular (olho seco) leve a moderado.
Cetoconazol	D01A – Antifúngicos de uso local	Creme dermatológico	20 mg/g	Tinha dos pés ( <i>tinea pedis</i> , pé-de-atleta), tinha das mãos ( <i>tinea manus</i> ), tinha do corpo ( <i>tinea corporis</i> ), tinha da virilha ( <i>tinea cruris</i> , <i>tinea inguinalis</i> ). Pitiríase versicolor ( <i>tinea versicolor</i> , pano branco ou micose de praia). Candidíase cutânea.
		Xampu	20 mg/ml	Dermatite seborréica.
Citrato de colina + betaína + racemetionina	A05B – Terapia biliar, lipotrópicos	Solução oral	100 + 50 + 10 mg/ml	Distúrbios hepáticos (do fígado), como esteatose hepática (gordura no fígado). Normaliza o metabolismo proteico e lipídico.
Citrato de ferro amoniacal	B03 – Antianêmicos	Solução oral	8,5 mg/ml	Anemia por deficiência de ferro.
Cloreto de benzalcônio + ácido bórico	S01AX - Outros produtos anti-infecciosos oftálmicos	Solução oftálmica	0,1 + 17 mg/ml	Irritações oculares causadas por exposição ao vento, pó ou outro agente irritante. Higiene dos olhos após banho de mar ou piscina.

Cloreto de benzalcônio + óxido de zinco + cânfora	D02A – Emolientes e protetores de uso local D03A – Cicatrizantes de uso local D08A – Antissépticos e desinfetantes de uso local	Pomada dermatológica	5 + 200 + 50 mg/g	Acne vulgar. Frieiras. Picadas de insetos, urticárias. Pequenas feridas (ferimentos leves e escoriações). Úlceras de decúbito (escaras). Desodorante e antiperspirante de axilas e pés.
Cloreto de cetilpiridínio	R02A – Preparações para a garganta	Pastilha	1,34 mg	Dores e irritações da mucosa da boca e da garganta, como: faringites (inflamação da faringe), amigdalites (inflamação da garganta), estomatites (inflamação da mucosa da boca), resfriados e por procedimentos odontológicos e pequenas cirurgias da boca e da garganta.
Cloreto de cetilpiridínio + benzocaína	R02A – Preparações para a garganta	Pastilha	1,466 + 10 mg	Dores e irritações da mucosa da boca e da garganta, como: faringites (inflamação da faringe), amigdalites (inflamação da garganta), estomatites (inflamação da mucosa da boca), resfriados. Procedimentos odontológicos e pequenas cirurgias da boca e da garganta.
		Solução spray de uso local	0,5 + 4 mg/ml	
Cloreto de cetilpiridínio + borato de sódio + benzocaína	R02A – Preparações para a garganta	Solução de uso local	1 + 60 + 0,2 mg/ml	Dores e irritações da mucosa da boca, gengiva e garganta.
Cloreto de cetilpiridínio + cloreto de cetalcônio	R02A – Preparações para a garganta	Pastilha	1,25 + 1,25 mg	Irritações da mucosa da boca e garganta.
Cloreto de dequalínio + benzocaína	R02A – Preparações para a garganta	Pastilha	0,25 + 5 mg	Dores e inflamações da mucosa da boca e garganta, como: aftas, amigdalites (inflamação nas amídalas), faringites (inflamação da garganta), estomatites (inflamação da boca), glossites (inflamação na língua).
Cloreto de sódio	R01A – Descongestionantes e outras	Gel nasal	6,0 mg/g	Mucosa nasal ressecada e irritada.
		Solução nasal	30 mg/ml	Congestão nasal. Mucosa nasal

	preparações nasais de uso local	spray		ressecada e irritada. Higiene nasal.
Cloreto de sódio + citrato de sódio + glicose + cloreto de potássio	A07C - Eletrólitos com carboidratos	Solução oral	2,05 + 0,98 + 22,75 + 2,16 mg/ml	Prevenir a desidratação. Manter a hidratação após a fase de reidratação (reposição das perdas acumuladas de água e eletrólitos). Diarreia aguda.
Cloreto de sódio + gliconato de zinco + glicose + citrato de sódio + citrato de potássio	A07C - Eletrólitos com carboidratos	Solução oral	2,076 + 0,061 + 25 + 0,94 + 2,16 mg/ml	Prevenir a desidratação. Manter a hidratação após a fase de reidratação (reposição das perdas acumuladas de água e eletrólitos). Diarreia aguda.
			1,757 + 0,06 + 11,88 + 2,892 + 1,506 mg/ml	Reidratação (reposição das perdas acumuladas de água e eletrólitos). Manter a hidratação após a fase de reidratação. Diarreia aguda.
Cloreto de sódio + glicose + citrato de potássio + citrato de sódio	A07C - Eletrólitos com carboidratos	Solução oral	2,05 + 22,75 + 2,16 + 0,98 mg/ml	Prevenir a desidratação. Manter a hidratação após a fase de reidratação (reposição das perdas acumuladas de água e eletrólitos). Diarreia aguda.
Cloridrato de acriflavina + metenamina + cloreto de metiltionínio + <i>Atropa belladonna</i> L.	G04B – Urológicos	Drágea	15 + 250 + 20 + 15 mg	Disúria (dor, ardor, desconforto para urinar).
Cloridrato de ambroxol	R05C – Expectorantes, excluindo associações com antitussígenos	Cápsula dura com microgrânulos de liberação controlada	75 mg	Secreções mucosas densas e viscosas (catarro, muco) nas vias aéreas, decorrentes ou associadas a doenças broncopulmonares.
		Solução oral	7,5 mg/ml	
		Xarope	6,0 mg/ml	
Cloridrato de amorolfina	D01A – Antifúngicos de uso local	Creme dermatológico	2,5 mg/g	Tinha dos pés ( <i>tinea pedis</i> , pé-de-atleta), tinha das mãos ( <i>tinea manus</i> ), tinha do corpo ( <i>tinea corporis</i> ), tinha da virilha ( <i>tinea cruris</i> , <i>tinea inguinalis</i> ). Pitíriase versicolor ( <i>tinea versicolor</i> , pano branco ou micose de praia). Candidíase cutânea.

		Esmalte	50 mg/ml	Micose de unha (onicomicose, <i>tinea unguium</i> ).
Cloridrato de azelastina	R01A – Descongestionantes e outras preparações nasais de uso local	Solução nasal spray	1 mg/ml	Rinite alérgica.
Cloridrato de benzidamina	A01A – Preparações bucais	Creme dental	5 mg/g	Dores e inflamações da mucosa da boca e língua como: aftas, estomatites (inflamação da mucosa da boca e gengivas), mucosite (inflamação da língua). Dor de dente e dores pós-cirúrgicas.
	R02A – Preparações para a garganta	Colutório, colutório spray	1,5 mg/ml	Dores e inflamações da mucosa da boca, língua e garganta como: aftas, faringites (inflamação da faringe), amigdalites (inflamação da garganta), estomatites (inflamação da mucosa da boca e gengivas), gripes e resfriados. Dor de dente. Procedimentos odontológicos e pequenas cirurgias da boca e da garganta.
Pastilha		3,15 mg		
Cloridrato de bromexina	R05C – Expectorantes, excluindo associações com antitussígenos	Solução oral	2 mg/ml	Secreções mucosas densas e viscosas (catarro, muco) nas vias aéreas, decorrentes ou associadas a doenças broncopulmonares.
		Xarope	1,6 mg/ml	
Cloridrato de butenafina	D01A – Antifúngicos de uso local	Creme dermatológico	10 mg/g	Tinha dos pés ( <i>tinea pedis</i> , pé-de-atleta), tinha do corpo ( <i>tinea corporis</i> ), tinha da virilha ( <i>tinea cruris</i> , <i>tinea inguinalis</i> ). Pitiríase versicolor ( <i>tinea versicolor</i> , pano branco ou micose de praia).
Cloridrato de clobutinol	R05D – Antitussígenos, excluindo associações com expectorantes	Xarope	4 mg/ml	Tosse seca (não produtiva, irritativa, sem catarro).
Cloridrato de difenidramina + cloreto de amônio + citrato de sódio	R02A – Preparações para a garganta	Pastilha	5 + 50 + 10 mg	Tosse. Irritações da garganta, faringites (inflamação da faringe).
	R06A – Anti-	Xarope	2,5 + 25 +	

	histamínicos para uso sistêmico		11,25 mg/ml	
Cloridrato de epinastina	R06A – Anti-histamínicos para uso sistêmico	Comprimido revestido	20 mg	Rinite alérgica. Prurido (coceira) decorrente de urticária, eczemas/dermatites.
		Xarope	2 mg/ml	
Cloridrato de fenazopiridina	G04B – Urológicos	Drágea	200 mg	Disúria (dor, ardor, desconforto para urinar) e outros sintomas da irritação da mucosa do trato urinário inferior causado por infecção, trauma, cirurgia, procedimentos hospitalares.
Cloridrato de fexofenadina	R06A – Anti-histamínicos para uso sistêmico	Comprimido revestido	180 mg	Sintomas da rinite alérgica, como espirros, obstrução nasal, prurido (coceira) nasal, coriza (nariz escorrendo), conjuntivite alérgica (ardor, vermelhidão e coceira nos olhos) e febre do feno (alergia ao pólen). Urticária.
		Suspensão oral	6 mg/ml	
Cloridrato de isotipendil	D04A – Antipruriginosos, incluindo anti-histamínicos, anestésicos e outros de uso local	Gel dermatológico	7,5 mg/g	Prurido (coceira). Picada de insetos.
Cloridrato de levamisol	P02C – Antinematóides	Comprimido	150 mg	Ascariíase (lombriga).
Cloridrato de lidocaína + cloreto de benzetônio	D08A – Antissépticos e desinfetantes de uso local	Solução dermatológica spray	25 + 1,3 mg/ml	Ferimentos superficiais na pele.
Cloridrato de nafazolina + maleato de feniramina	S01G – Descongestionantes e antialérgicos oftálmicos	Solução oftálmica	0,25 + 3 mg/ml	Irritação (vermelhidão) e prurido (coceira) oculares causados por poluição, fumaça, pó, pelos de animais, pólen, grama, caspa.
Cloridrato de nafazolina + sulfato de zinco	S01G – Descongestionantes e antialérgicos oftálmicos	Solução oftálmica	0,15 + 0,3 mg/ml	Irritações oculares causadas por poeira, vento, calor, fumaça, gases irritantes, luz e outros agentes irritantes.
Cloridrato de oxomemazina +	R05C – Expectorantes,	Xarope	0,4 + 20 + 4 + 6 mg/ml	Tosse seca (irritativa, não produtiva, sem catarro) associada a várias

iodeto de potássio + benzoato de sódio + guaifenesina	excluindo associações com antitussígenos  R06A – Anti-histamínicos para uso sistêmico			condições respiratórias.
Cloridrato de papaverina + dipirona + extrato fluido de <i>Atropa belladonna</i> Linné	A03D – Antiespasmódicos em associação com analgésicos	Comprimido	30 + 250 mg + 0,03 ml	Cólicas gastrintestinal (estômago e intestinos), das vias biliares e dos órgãos sexuais e urinários. Cólica menstruais (dismenorreia).
Cloridrato de procaína + timol + mentol + cânfora	A01A – Preparações bucais	Solução de uso local	1 + 4 + 8 + 2 mg/ml	Dor de dente.
Cloridrato de terbinafina	D01A – Antifúngicos de uso local	Creme dermatológico	10 mg/g	Tinha dos pés ( <i>tinea pedis</i> , pé-de-atleta), tinha do corpo ( <i>tinea corporis</i> ), tinha da virilha ( <i>tinea cruris</i> , <i>tinea inguinalis</i> ). Pitíriase versicolor ( <i>tinea versicolor</i> , pano branco ou micose de praia). Candidíase cutânea.
		Solução dermatológica	10 mg/ml	Tinha dos pés ( <i>tinea pedis</i> , pé-de-atleta), tinha do corpo ( <i>tinea corporis</i> ), tinha da virilha ( <i>tinea cruris</i> , <i>tinea inguinalis</i> ). Pitíriase versicolor ( <i>tinea versicolor</i> , pano branco ou micose de praia).
Clotrimazol	G01A – Anti-infecciosos e antissépticos ginecológicos, excluindo associações com corticosteroides	Comprimido vaginal	500 mg	Candidíase vaginal.
		Creme vaginal	20 mg/g	Candisiase vaginal. Candidíase da vulva. Candidíase da glande e prepúcio.
	D01A – Antifúngicos de uso local	Creme dermatológico	10 mg/g	Tinha dos pés ( <i>tinea pedis</i> , pé-de-atleta), tinha das mãos ( <i>tinea manus</i> ), tinha do corpo ( <i>tinea corporis</i> ), tinha da virilha ( <i>tinea cruris</i> , <i>tinea inguinalis</i> ). Pitíriase versicolor ( <i>tinea versicolor</i> , pano branco ou micose de praia). Micose de unha (onicomicose, <i>tinea unguium</i> ). Dermatite seborreica. Micose nas dobras de pele (intertrigo). Candidíase cutânea.

				Candíase da vulva. Candidíase da glândula (balanite) e prepúcio (balanopostite).
		Solução dermatológica spray	10 mg/ml	Tinha dos pés ( <i>tinea pedis</i> , pé-de-atleta), tinha das mãos ( <i>tinea manus</i> ), tinha do corpo ( <i>tinea corporis</i> ), tinha da virilha ( <i>tinea cruris</i> , <i>tinea inguinalis</i> ). Pitiríase versicolor ( <i>tinea versicolor</i> , pano branco ou micose de praia). Micose de unha (onicomicose, <i>tinea unguium</i> ). Dermatite seborreica. Micose nas dobras de pele (intertrigo).
Coaltar	D01A – Antifúngicos de uso local D05A – Antipsoriásicos de uso local	Xampu	40 mg/ml	Caspa. Oleosidade do couro cabeludo. Dermatite seborreica, psoríase e eczema do couro cabeludo.
Colagenase	D03B – Enzimas de uso local	Pomada dermatológica	1,2 U/g	Pequenas feridas (ferimentos leves e escoriações). Úlceras de decúbito (escaras). Fissuras (rachaduras) da pele.
Deltametrina	P03A – Ectoparasiticidas, incluindo escabicidas	Loção dermatológica, xampu	0,2 mg/ml	Pediculose (piolhos e lêndeas). Ftíriase (chatos/piolhos da região pubiana). Escabiose (sarna). Infestações por carrapatos..
Dexpanthenol	D02A – Emolientes e protetores de uso local D03A – Cicatrizantes de uso local	Pomada dermatológica	50 mg/g	Dermatite de fraldas (assaduras, dermatite amoniacal). Fissuras (rachaduras) de pele e mucosas (mamilos, lábios e região anal). Pequenas feridas (ferimentos leves e escoriações). Úlceras de decúbito (escaras). Queimaduras provocadas pelo sol.
Dextrana + hipromelose	S01X – Outros produtos oftalmológicos	Solução oftálmica	1 + 3 mg/ml	Ressecamento ocular (olho seco). Irritação e ardor oculares causados por exposição ao vento, sol ou outro agente irritante.
Dextrana + hipromelose + glicerol	S01X – Outros produtos oftalmológicos	Solução oftálmica	1 + 3 + 2 mg/ml	Ressecamento ocular (olho seco). Irritação e ardor oculares causados por fumaça, pó, poluentes, produtos

				químicos, raios solares, vento e calor excessivo.
Diclofenaco dietilamônio	M02A – Produtos para dor articular e muscular de uso local	Gel dermatológico	23,2 mg/g	Dor e inflamação localizadas do sistema músculo-esquelético, como: tendinites (inflamação dos tendões), "cotovelo de tenista", bursites (inflamação da bursa, pequena bolsa contendo líquido que envolve as articulações), síndrome mão-ombro, periartropatias e as decorrentes de traumatismos, como: contusões, entorses, distensões, lesões esportivas. Lombalgia (dor na lombar, nas costas) e dor da osteoartrite (degeneração da cartilagem das articulações, artrose) de joelhos ou dedos.
		Solução dermatológica aerossol	11,6 mg/g	
Diclofenaco sódico	M02A – Produtos para dor articular e muscular de uso local	Gel dermatológico	10 mg/g	Dor e inflamação localizadas do sistema músculo-esquelético decorrentes de traumatismos, como: contusões, entorses, luxações.
Dipirona	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido, comprimido efervescente	1000 mg	Dor e febre.
		Solução oral	500 mg/ml	
		Supositório	300 mg	
		Xarope	50 mg/ml	
Dipirona + cafeína	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido	500 + 65 mg	Cefaleia (dor de cabeça), enxaquecas.
Dipirona + citrato de orfenadrina + cafeína	M03B – Relaxantes musculares de ação central	Comprimido	300 + 35 + 50 mg	Dor associada a contraturas musculares, incluindo cefaleia (dor de cabeça) tensional.
		Solução oral	300 + 35 + 50 mg/ml	
Dipirona + cloridrato de isometepteno + cafeína	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Solução oral	300 + 50 + 30 mg/ml	Cefaleia (dor de cabeça), enxaquecas. Dores abdominais tipo cólicas.



Dipirona + cloridrato de prometazina + cloridrato de adifenina	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido	500 + 5 + 10 mg	Febre. Dores leves a moderadas, como cólicas do trato gastrointestinal, cólicas nos rins e fígado, cefaleia (dor de cabeça), mialgias (dores musculares), artralguas (dor da artrite, dor nas articulações) e dores pós-operatórias.
		Solução oral	333,333 + 3,333 + 6,666 mg/ml	
Dipirona + maleato de clorfeniramina + cafeína	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido revestido	500 + 2 + 30 mg	Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre e cefaleia (dor de cabeça) e alergias, como coriza, espirros e obstrução nasal.
Dipirona + mucato de isometepteno + cafeína	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Drágea, comprimido revestido	300 + 30 + 30mg	Cefaleia (dor de cabeça), enxaquecas. Dores abdominais tipo cólicas.
Docusato sódico + bisacodil	A06A – Laxantes	Comprimido revestido	60 + 5 mg	Facilitar a evacuação em casos necessários, como no preparo do paciente para exames diagnósticos; antes ou após procedimentos cirúrgicos; e em pacientes acamados, portadores de hemorroidas ou físsuras anais.
Dropropizina	R05D – Antitussígenos, excluindo associações com expectorantes	Solução oral	30 mg/ml	Tosse seca (irritativa, não produtiva, sem catarro) associada a várias condições das vias aéreas superiores e brônquicas.
		Xarope	3 mg/ml	
Essência de terebentina + salicilato de metila + cânfora + mentol	M02A – Produtos para dor articular e muscular de uso local	Gel dermatológico	0,2222 + 0,0444 ml/g + 44,4 + 98 mg/g	Dores leves a moderadas, como: mialgia (dor muscular), reumatismo (grupo de doenças que afeta as articulações, músculos e esqueleto), torcicolo, nevralgias (dor aguda em um ou mais nervos), contusões.
Eucaliptol + terpina + mentol	R05X – Outros produtos para gripe e resfriados	Xarope	0,00016 mL/mL + 0,123 + 0,16 mg/mL	Secreções mucosas densas e viscosas (catarro, muco) nas vias aéreas, decorrentes ou associadas à traqueo-bronquites.
Fendizoato de cloperastina	R05D – Antitussígenos, excluindo associações com expectorantes	Suspensão oral	35,4 mg/ml	Tosse seca (irritativa, não produtiva, sem catarro) sem causa definida.
		Xarope	3,54 mg/ml	
Fenol + mentol	S02D – Outros produtos otológicos	Solução otológica	18,6 + 1,3 mg/ml	Dor de ouvido. Remoção de cerume (secreção do ouvido externo).

Ferro quelato + cloridrato de piridoxina + nicotinamida	B03 – Antianêmicos	Solução oral	3 + 0,05 + 0,80 mg/ml	Anemia por deficiência de ferro.
Ferrocarbonila	B03 – Antianêmicos	Comprimido mastigável	44,9 mg	Anemia por deficiência de ferro. Suplementação de ferro em crianças em fase de crescimento acelerado.
Flurbiprofeno	R02A – Preparações para a garganta	Pastilha	8,75 mg	Inflamação da garganta.
Flutrimazol	D01A – Antifúngicos de uso local	Creme dermatológico	10 mg/g	Micoses superficiais da pele.
		Solução dermatológica spray	10 mg/ml	
Fosfato de sódio monobásico + fosfato de sódio dibásico	A06A – Laxantes	Solução retal	160 + 60 mg/ml	Constipação intestinal (prisão-de-ventre).
Glicinato férrico + cianocobalamina (Vit. B12) + dexpanthenol + nicotinamida (Vit. B3) + nitrato de tiamina (Vit. B1) + riboflavina (Vit. B2)	B03 – Antianêmicos	Suspensão oral	27,58 + 0,003 + 0,1 + 0,4 + 0,1 mg	Anemias por deficiência de ferro. Suplemento vitamínico.
Glicinato férrico	B03 – Antianêmicos	Suspensão oral	250 mg/ml	Suplemento de ferro em: anemias carenciais, dietas restritivas e inadequadas, doenças crônicas/convalescença, na gestação e lactação, para idosos, recém-nascidos, lactentes e crianças em fase de crescimento.
Glicinato férrico + ácido fólico	B03 – Antianêmicos	Solução oral	15 + 0,5 mg/ml	Anemias por deficiência de ferro e ácido fólico.
Guaiifenesina	R05C – Expectorantes,	Xarope	13,333 mg/ml	Tosse associada a gripes e resfriados.

	excluindo associações com antitussígenos			
Guaiifenesina + bromidrato de dextrometorfano	R05F – Antitussígenos associados a expectorantes	Xarope	13,3 + 1,3 mg/ml	Tosse produtiva (com catarro) ou seca (não produtiva, irritativa, sem catarro) associada a gripes e resfriados.
Hidróxido de alumínio	A02A – Antiácidos	Comprimido	230 mg	Azia (acidez e queimação estomacal).
Hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio	A02A – Antiácidos	Comprimido mastigável	400 + 400 mg	Azia (acidez e queimação estomacal).
		Pó efervescente	35,6 + 37 mg/g	Azia (acidez e queimação estomacal), dispepsia (dor ou desconforto no estômago devido à má digestão), enjoo e vômito. Distensão abdominal.
Hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio + oxetacaína	A02A – Antiácidos	Suspensão oral	60 + 20 + 2 mg/ml	Regurgitação ácida (refluxo), azia (acidez e queimação estomacal), epigastralgia (dor na boca do estômago) e dispepsia (dor ou desconforto no estômago devido à má digestão). Distensão abdominal.
Hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio + simeticona	A02A – Antiácidos	Comprimido mastigável	153 + 200 + 25 mg	Azia (acidez e queimação estomacal). Acumulação de gases no trato digestivo, que causa sensação de inchaço, desconforto, distensão abdominal, eructação (arroto) e flatulência (gases intestinais).
		Suspensão oral	120 + 41,5 + 7 mg/ml	
Hidroxiquinolina + trolamina	S02D – Outros produtos otológicos	Solução otológica	0,4 + 140 mg/ml	Remoção de cerume (secreção do ouvido externo).
Hipromelose	S01X – Outros produtos oftalmológicos	Solução oftálmica	5 mg/ml	Ressecamento ocular (olho seco). Lubrificação ocular durante o uso de lentes de contato duras.
Hipromelose + cetrimida	S01X – Outros produtos oftalmológicos	Solução oftálmica	3,2 + 0,1 mg/ml	Ressecamento ocular (olho seco) causado por secreção lacrimal deficiente; distúrbios funcionais resultantes de doenças locais ou sistêmicas; ausência ou deficiência do fechamento da pálpebra.

Ibuprofeno	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Cápsula gelatinosa mole, comprimido	400 mg	Febre. Dores leves a moderadas, como: mialgia (dor muscular), lombalgia (dor nas costas), artralgia (dor de artrite, dor nas articulações), cefaleia (dor de cabeça) tensional, enxaqueca, dor de dente, dismenorreia (cólicas menstruais) e as associadas à gripes e resfriados comuns.
		Suspensão oral	100 mg/ml	Febre. Dores leves a moderadas, como: mialgia (dor muscular), dorsalgia (dor nas costas), cefaleia (dor de cabeça), dor de garganta, dor de dente, dismenorreias (cólicas menstruais) e as associadas à gripes e resfriados comuns.
Ibuprofeno arginina	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido revestido, granulado	770 mg (400 + 370 mg)	Febre. Dores leves a moderadas, como: mialgia (dor muscular), nevralgia (dor me um ou mais nervos), dor de dente, cefaleia (dor de cabeça), dismenorreia (cólicas menstruais), e as associadas à gripes e resfriados comuns e traumatismos, como contusões, entorses, distensões, luxações.
Iodo + óleo de cade + ácido salicílico	D01A – Antifúngicos de uso local	Solução dermatológica	10 + 10 + 20 mg/ml	Tinha dos pés ( <i>tinea pedis</i> , pé-de- atleta), tinha das mãos ( <i>tinea manus</i> ), tinha do corpo ( <i>tinea corporis</i> ), tinha da virilha ( <i>tinea cruris</i> , <i>tinea inguinalis</i> , eczema marginado de Hebra). Micose nas dobras de pele (intertrigo).
Iodopovidona	D06A – Antibióticos de uso local D08A – Antissépticos e desinfetantes de uso local	Pomada dermatológica	100 mg/g	Ferimentos superficiais, pequenos cortes, escoriações e arranhões.
Iodopovidona	D06A – Antibióticos de uso local D08A – Antissépticos e desinfetantes de uso local	Sabonete	7 mg/g	Higienização das mãos e corpo, incluindo mucosa vaginal. Ferimentos superficiais na pele. Afecções cutâneas (furúnculos, acnes, impetigos, dermatites infecciosas e dermatomicoses superficiais).

Lactato de amônio + alantoína	D02A – Emolientes e protetores de uso local	Loção dermatológica	120 + 1 mg/ml	Pele seca e áspera. Hiperqueratose palmar e plantar (espessamento da pele das palmas das mãos e pés). Ictiose vulgar (ressecamento e descamação da pele).
Levomentol + cânfora	R01A – Descongestionantes e outras preparações nasais de uso local	Inalante	415,4 + 415,4 mg/ml	Obstrução nasal (nariz entupido).
Levomentol + cânfora + óleo de eucalipto	R05X – Outros produtos para gripe e resfriados	Unguento	28,2 + 52,6 + 13,3 mg/g	Congestão nasal (naris entupido), tosse e mialgia (dor muscular) associadas à gripes e resfriados.
Loratadina	R06A – Anti-histamínicos para uso sistêmico	Comprimido, comprimido revestido	10 mg	Sintomas da rinite alérgica, como espirros, obstrução nasal (nariz entupido), prurido (coceira) nasal, coriza (nariz escorrendo), conjuntivite alérgica (ardor, vermelhidão e coceira nos olhos) e febre do feno (alergia ao pólen). Urticária.
		Xarope	1 mg/ml	
Macrogol + bicarbonato de sódio + cloreto de sódio + cloreto de potássio	A06A – Laxantes	Pó para preparação extemporânea	13,125 + 0,1775 + 0,3507 + 0,0466 g	Constipação intestinal (prisão-de-ventre), impactação fecal (grande massa de fezes empedrada e endurecida que obstrui o trânsito intestinal). Facilitar a evacuação no preparo do paciente para exames diagnósticos.
Magaldrato	A02A – Antiácidos	Suspensão oral	80 mg/ml	Azia (acidez e queimação estomacal).
Magaldrato + simeticona	A02A – Antiácidos	Comprimido mastigável	800 + 100 mg	Azia (acidez e queimação estomacal). Acumulação de gases no trato digestivo, que causa sensação de inchaço, dor ou desconforto, distensão abdominal, eructação (aroto) e flatulência (gases intestinais).
		Suspensão oral	80 + 10 mg/ml	
Maleato de bronfeniramina + cloridrato de fenilefrina	R01B – Descongestionantes nasais para uso sistêmico	Comprimido revestido de liberação programada	12 + 15 mg	Sintomas de gripe, resfriado, rinite e sinusite, alérgicas ou não, como: congestão nasal (nariz entupido), coriza (nariz escorrendo), prurido (coceira) nasal.
		Solução oral	2 + 2,5 mg/ml	

		Xarope	0,4 + 1 mg/ml	
Maleato de dexclorfeniramina	R06A – Anti-histamínicos para uso sistêmico	Comprimido revestido	2 mg	Prurido (coceira). Ezemas/dermatites alérgicos. Urticária. Picada de insetos. Rinite alérgica. Conjuntivite alérgica. Dermatite atópica.
		Drágea repetabs	6 mg	
		Solução oral	2,8 mg/ml	
Maleato de mepiramina + hidróxido de alumínio + ácido acetilsalicílico + cafeína	N02B – Analgésicos e antipiréticos R06A – Anti-histamínicos para uso sistêmico	Comprimido	15 + 150 + 150 + 50 mg	Cefaleias (dor de cabeça) e alergias.
Mebendazol	P02C – Antinematóides	Comprimido	500 mg	Enterobíase (oxiuríase, oxiúros). Tricuríase (verme do chicote). Ascaridíase (lombriga). Ancilostomíase e necatoríase (amarelão).
		Suspensão oral	20 mg/ml	Enterobíase (oxiuríase, oxiúros). Tricuríase (verme do chicote). Ascaridíase (lombriga). Ancilostomíase e necatoríase (amarelão). Teníase (solitária).
Metenamina + cloreto de metiltionínio	J01X – Outros antibacterianos de uso sistêmico	Drágea	120 + 20 mg	Cistites (infecções na bexiga). Prevenção de cistites em pacientes em uso de sonda e em pessoas com infecções urinárias que ocorrem com frequência.
Metronidazol	D06B – Quimioterápicos de uso local	Gel dermatológico	7,5 mg/g	Rosácea.
Naproxeno	M01A – Anti-inflamatórios e antirreumáticos não esteroidais	Comprimido	500 mg	Febre. Dor e inflamação da garganta. Dor e inflamação localizadas do sistema musculoesquelético, como: torcicolo, bursite (inflamação da bursa, pequena bolsa contendo líquido que envolve as articulações), tendinite (inflamação dos tendões), "cotovelo do tenista" e as decorrentes de traumatismos, como entorses, distensões, contusões, lesões leves decorrentes de prática

				esportiva. Lombalgia (dor na lombar, dor nas costas), artralgia (dor da artrite, dor nas articulações), dor nas pernas, dor de dente, dor abdominal e pélvica, cefaleia (dor de cabeça), dor reumática. Sintomas de gripe e resfriado comuns.
Naproxeno sódico	M01A – Anti-inflamatórios e antirreumáticos não esteroidais	Comprimido revestido	550 mg	Febre. Dor e inflamação da garganta. Dor e inflamação localizadas do sistema musculoesquelético, como: torcicolo, bursite (inflamação da bursa, pequena bolsa contendo líquido que envolve as articulações), tendinite (inflamação dos tendões), "cotovelo do tenista" e as decorrentes de traumatismos, como entorses, distensões, contusões, lesões leves decorrentes de prática esportiva. Lombalgia (dor na lombar, dor nas costas), artralgia (dor da artrite, dor nas articulações), dor nas pernas, dor de dente, dor abdominal e pélvica, cefaleia (dor de cabeça), dor reumática. Sintomas de gripe e resfriado comuns.
Nicotina	N07B – Transtornos de dependência (vício)	Adesivo transdérmico	21 mg	Dependência do tabaco. Sintomas da síndrome de abstinência de nicotina.
		Pastilha, goma mastigável	4 mg	
Nitrato de miconazol	D01A – Antifúngicos de uso local	Aerossol dermatológico, creme dermatológico, pó dermatológico	20 mg/g	Tinha dos pés ( <i>tinea pedis</i> , pé-de-atleta), tinha do corpo ( <i>tinea corporis</i> ), tinha da virilha ( <i>tinea cruris</i> , <i>tinea inguinalis</i> ). Pitíriase versicolor ( <i>tinea versicolor</i> , pano branco ou micose de praia). Cromofitose. Micose de unha (onicomicose, <i>tinea unguium</i> ). Candidíase cutânea.
		Loção dermatológica, emulsão dermatológica	20 mg/ml	Tinha dos pés ( <i>tinea pedis</i> , pé-de-atleta), tinha do corpo ( <i>tinea corporis</i> ), tinha da virilha ( <i>tinea cruris</i> , <i>tinea inguinalis</i> ), tinha da cabeça ( <i>tinea capitis</i> ), tinha de barba ( <i>tinea barbae</i> ). Micose de unha (onicomicose, <i>tinea unguium</i> ). Pitíriase versicolor ( <i>tinea versicolor</i> , pano branco ou micose de praia). Candidíase cutânea. Candidíase em

				dobras da pele (intertrigo). Eritrasma (infecção cutânea por bactéria). Dermatite de fraldas (assaduras, dermatite amoniacal).
	G01A – Anti-infecciosos e antissépticos ginecológicos, excluindo associações com corticosteroides	Creme vaginal	20 mg/g	Candíase vaginal. Candíase perianal (em volta do ânus).
Nitrato de oxiconazol	D01A – Antifúngicos de uso local	Solução dermatológica	10 mg/ml	Tinha dos pés ( <i>tinea pedis</i> , pé-de-atleta), tinha das mãos ( <i>tinea manus</i> ), tinha do corpo ( <i>tinea corporis</i> ), tinha da virilha ( <i>tinea cruris</i> , <i>tinea inguinalis</i> ), tinha da cabeça ( <i>tinea capitis</i> ). Pityriase versicolor ( <i>tinea versicolor</i> , pano branco ou micose de praia). Dermatite seborreica. Micose nas dobras de pele (intertrigo). Candíase cutânea. Candíase da vulva (vulvite), glândula (balanite) e prepúcio (balanopostite). Infecções mistas por fungos e bactérias Gram-positivas.
Óxido de zinco + salicilato de fenila + ácido bórico + enxofre + mentol + cânfora	D01A – Antifúngicos de uso local	Pó dermatológico	10 + 2,0 + 5,0 + 5,0 + 0,2 + 1,0 mg/g	Dermatite de fraldas (assaduras, dermatite amoniacal). Brotoejas. Frieiras. Desodorante e antiperspirante.
Palmitato de retinol (Vit. A) + colecalciferol (Vit. D3) + acetato de racalfatocoferol (Vit. E) + alantoína	D02A – Emolientes e protetores de uso local	Creme dermatológico	5000 + 1000 + 20 UI/g + 2 mg/g	Pele seca e áspera. Irritações da pele de pequena intensidade provocadas por exposição excessiva ao sol.
Paracetamol	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido efervescente	500 mg	Febre. Dores leves a moderadas, como: cefaleia (dor de cabeça), enxaqueca, dores músculo-esqueléticas, dor de garganta, dor de dente, dor da osteoartrite (artrose), dismenorreia (cólicas menstruais) e as associadas à procedimentos odontológicos e vacina.
		Comprimido	160 mg	Febre. Dores leves a moderadas,



		mastigável		como: cefaleia (dor de cabeça), dor de dente, dor de garganta e as associadas à gripes e resfriados comuns.
		Comprimido revestido	750 mg	Febre. Dores leves a moderadas, como: cefaleia (dor de cabeça), dor no corpo, dor de dente, lombalgia (dor nas costas), mialgias (dores musculares), artralgias (dores da artrite, dores na articulação), dismenorreia (cólicas menstruais) e as associadas à gripes e resfriados comuns.
		Pó para preparação extemporânea	100 mg/g	Sintomas da gripe e resfriado comuns, como: febre, cefaleia (dor de cabeça) e dor no corpo.
		Solução oral	200 mg/ml	Febre. Dores leves a moderadas, como: cefaleia (dor de cabeça), dor de dente, dor de garganta e as associadas à gripes e resfriados comuns.
		Suspensão oral	140 mg/ml	Febre. Dores leves a moderadas, como: cefaleia (dor de cabeça), dor no corpo, dor de dente, dor de garganta, lombalgia (dor nas costas), mialgias (dores musculares), artralgias (dores da artrite, dores na articulação) e as associadas à gripes e resfriados comuns.
Paracetamol + cafeína	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido efervescente	500 + 65 mg	Febre. Dores leves a moderadas, como: cefaleia (dor de cabeça), enxaqueca, dor no corpo, dor de dente, lombalgia (dor nas costas), mialgias (dores musculares), artralgias (dores da artrite, dores na articulação), dor de garganta, dor de dente, dismenorreia (cólicas menstruais) e as associadas à gripes e resfriados comuns, procedimentos odontológicos e vacinas.
Paracetamol + carisoprodol + cafeína	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido	350 + 150 + 50 mg	Dores leves a moderadas, como: mialgia (dor muscular), torcicolo e as decorrentes de traumatismos como: contusões, entorses, distensões, luxações.

Paracetamol + citrato de orfenadrina + caféina	M03B – Relaxantes musculares de ação central	Comprimido	450 + 35 + 50 mg	Dores leves a moderadas associadas a contraturas musculares, incluindo cefaleia (dor de cabeça) tensional.
Paracetamol + cloridrato de fenilefrina + maleato de carbinoxamina	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Solução oral, xarope	40 + 1 + 0,4 mg/ml	Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, cefaleia (dor de cabeça), mialgias (dor muscular), coriza (nariz escorrendo), espirros e congestão nasal (nariz entupido).
Paracetamol + cloridrato de fenilefrina + maleato de carbinoxamina + citrato de pentoxiverina	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido	400 + 10 + 2 + 10 mg	Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, dor e congestão nasal.
Paracetamol + cloridrato de fenilefrina + maleato de clorfeniramina	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido, cápsula dura	400 + 4 + 4 mg	Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, cefaleia (dor de cabeça), mialgias (dor muscular), coriza (nariz escorrendo), espirros e congestão nasal (nariz entupido).
		Pó para solução oral	80 + 0,8 + 0,8 mg/g	
		Solução oral	40 + 0,6 + 0,6 mg/ml	
Paracetamol + cloridrato de fenilefrina + paracetamol	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido	400 + 20 + 400 mg	Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, dor e congestão nasal.
Paracetamol + cloridrato de fenilefrina + paracetamol + maleato de carbinoxamina	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido	400 + 20 + 400 + 4 mg	Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, dor e congestão nasal.
Paracetamol + cloridrato de fenilefrina + paracetamol + maleato de carbinoxamina + paracetamol	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido	400 + 20 + 400 + 4 + 400	Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, dor e congestão nasal.
Paracetamol + maleato de	N02B – Analgésicos e	Solução oral	120 + 2 mg/ml	Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, dor e

carbinoxamina	antipiréticos			congestão nasal.
Paracetamol + propifenazona + cafeína	N02B – Analgésicos e antipiréticos	Comprimido	250 + 150 + 50 mg	Febre. Dores leves a moderadas, como: cefaleia (dor de cabeça), dor de dente e as associadas à gripes e resfriados comuns.
Permetrina	P03A – Ectoparasiticidas, incluindo escabicidas	Emulsão dermatológica, sabonete	10 mg/g	Pediculose (piolhos e lêndeas).
		Xampu	10 mg/ml	
		Loção dermatológica	50 mg/ml	Escabiose (sarna).
Peróxido de benzoíla + enxofre	D10A – Preparações antiacne de uso local	Creme dermatológico	50 + 20 mg/g	Acne vulgar leve (cravos e espinhas).
Picossulfato de sódio	A06A – Laxantes	Solução oral	7,5 mg/ml	Constipação intestinal (prisão-de-ventre). Facilitar a evacuação em casos necessários, como no preparo do paciente para exames diagnósticos; antes ou após procedimentos cirúrgicos; e em pacientes acamados, portadores de hemorroidas ou fissuras anais.
Picossulfato de sódio + óleo mineral leve + ágar-ágar	A06A – Laxantes	Emulsão oral	0,334 + 282,25 + 2,72 mg/ml	Constipação intestinal (prisão-de-ventre).
Piridoxina + metionina	A02A – Antiácidos	Solução oral	1 + 10 mg/ml	Dispepsia (dor ou desconforto no estômago devido à má digestão), enjoo e vômito. Distensão abdominal.
Policarbofila cálcica	A06A – Laxantes	Comprimido revestido	625 mg	Constipação intestinal (prisão-de-ventre) ou diarreia, associadas a condições como diverticulose (tipo de hérnia na parede do intestino que pode ter como consequência uma inflamação local) e síndrome do intestino irritável (caracterizada por dor abdominal com cólica, distensão abdominal por gases, constipação ou diarreia).

Policresuleno + cloridrato de cinchocaína	C05A – Agentes para tratamento de hemorroidas e fissuras anais de uso local	Pomada retal	50 + 10 mg/g	Hemorroidas. Fissuras, prurido (coceira) e eczemas (irritação com vermelhidão) da região do ânus provocados por afecções anorretais. Curativo após cirurgias proctológicas.
		Supositório	100 + 27 mg	
Prometazina	D04A – Antipruriginosos, incluindo anti-histamínicos, anestésicos e outros de uso local	Creme dermatológico	20 mg/g	Prurido (coceira). Picada de insetos.
Racemtionina + cloreto de colina	A05B – Terapia biliar, lipotrópicos	Comprimido revestido	100 + 20 mg	Distúrbios hepáticos (do fígado).
Racemtionina + cloreto de colina + betaína + cianocobalamina	A05B – Terapia biliar, lipotrópicos	Solução oral	10 + 50 + 10 + 0,005 mg	Hepatoprotetor (proteção do fígado contra agressões de origem alimentar (dietas gordurosas, ingestão excessiva de bebidas alcoólicas), medicamentosa ou infecciosa.). Dispepsia (dor ou desconforto no estômago devido à má digestão), enjoo e vômito. Enxaqueca digestiva.
Racemtionina + cloreto de colina + inositol + cianocobalamina	A05B – Terapia biliar, lipotrópicos	Drágea	100 + 25 + 50 + 0,002 mg	Hepatoprotetor (proteção do fígado contra agressões de origem alimentar (dietas gordurosas, ingestão excessiva de bebidas alcoólicas), medicamentosa ou infecciosa.).
Sacarato de óxido férrico	B03 – Antianêmicos	Solução oral	0,4 ml/ml	Anemias por deficiência de ferro.
<i>Saccharomyces boulardii</i>	A07F – Microrganismos antidiarreicos	Cápsula gelatinosa dura; pó oral	250 mg	Diarreias de diferentes causas. Restauração da flora intestinal.
Salicilato de etilenoglicol + levomentol + acetato de racealfatocoferol + cânfora	M02A – Produtos para dor articular e muscular de uso local	Emplastro	175 + 140 + 140 + 42 mg	Dor e inflamação localizadas do sistema musculoesquelético, como: torcicolo, tendinites (inflamação dos tendões), fadiga muscular, rigidez nos ombros e as decorrentes de traumatismos, como contusões, pancadas, torções, entorses. Mialgia (dor muscular), lombalgia (dos nas costas), artralgia (dor de artrite, dor

				nas articulações), nevralgia (dor aguda em um ou mais nervos).
Salicilato de metila + cânfora + levomentol	M02A – Produtos para dor articular e muscular de uso local	Adesivo dermatológico	144 + 28,4 + 131 mg	Dor e inflamação localizadas do sistema musculoesquelético, como: torcicolo, tendinites (inflamação dos tendões), fadiga muscular, rigidez nos ombros e as decorrentes de traumatismos, como contusões, pancadas, torções, entorses. Mialgia (dor muscular), lombalgia (dos nas costas), artralgia (dor de artrite, dor nas articulações), nevralgia (dor aguda em um ou mais nervos).
Salicilato de metila + cânfora + mentol	M02A – Produtos para dor articular e muscular de uso local	Pomada dermatológica	52,5 + 44,4 + 20 mg/g	Dores leves a moderadas, como: mialgia (dor muscular), reumatismo (grupo de doenças que afeta as articulações, músculos e esqueleto), torcicolo, nevralgias (dor em um ou mais nervos), contusões.
		Solução dermatológica aerossol	0,0333 ml/ml + 33,3 + 8,3 mg/ml	
Salicilato de metila + extrato fluido de <i>Beladonna</i> + cânfora	M02A – Produtos para dor articular e muscular de uso local	Gel dermatológico	40 + 13,6 + 10 mg/g	Dores leves a moderadas, como: torcicolo, câimbras, nevralgias (dor em um ou mais nervos) e as decorrentes de traumatismos, como contusões, pancadas, torções, entorses, espasmos.
Salicilato de metila + iodo	M02A – Produtos para dor articular e muscular de uso local	Pomada dermatológica	50 + 50 mg/g	Dores leves a moderadas, como: mialgia (dor muscular), artralgia (dor de artrite, dor nas articulações) e as decorrentes de traumatismos, como contusões e entorses.
Salicilato de metila + levomentol	M02A – Produtos para dor articular e muscular de uso local	Gel dermatológico	150 + 70 mg/g	Dor e inflamação localizadas do sistema musculoesquelético, como: torcicolo, tendinites (inflamação dos tendões), fadiga muscular, rigidez nos ombros e as decorrentes de traumatismos, como contusões, pancadas, torções, entorses. Mialgia (dor muscular), lombalgia (dos nas costas), artralgia (dor de artrite, dor nas articulações), nevralgia (dor aguda em um ou mais nervos).
		Adesivo dermatológico	105 + 31,5 mg	
Salicilato de metila + mentol	M02A – Produtos para dor articular e muscular de uso local	Gel dermatológico, creme dermatológico	150 + 100 mg/g	Dores leves a moderadas, como: mialgia (dor muscular), reumatismo (grupo de doenças que afeta as articulações, músculos e esqueleto),

		Pomada dermatológica	250 + 250 mg/g	torcicolo, nevralgias (dor em um ou mais nervos), contusões.
		Solução dermatológica aerossol	50 + 10 mg/g	
Salicilato de metila + óxido de zinco + bálsamo do peru + extrato fluido de <i>Beladonna</i> + cânfora	M02A – Produtos para dor articular e muscular de uso local	Pomada dermatológica	50 + 90 + 20 + 16 + 10 mg/g	Dores leves a moderadas, como: torcicolo, nevralgias (dor em um ou mais nervos) e as decorrentes de traumatismos, como contusões, pancadas, torções, entorses, espasmos.
Salicilato de metila + salicilato de etilenoglicol + levomentol + cânfora	M02A – Produtos para dor articular e muscular de uso local	Solução dermatológica aerossol	30 + 19 + 38,5 + 38,5 mg/ml	Dor e inflamação localizadas do sistema musculoesquelético, como: torcicolo, tendinites (inflamação dos tendões), fadiga muscular, rigidez nos ombros e as decorrentes de traumatismos, como contusões, pancadas, torções, entorses. Mialgia (dor muscular), lombalgia (dos nas costas), artralgia (dor de artrite, dor nas articulações), nevralgia (dor aguda em um ou mais nervos).
Salicilato de metila + salicilato de etilenoglicol + levomentol + cânfora + timol	M02A – Produtos para dor articular e muscular de uso local	Emplastro	144,14 + 21,84 + 131,04 + 28,4 + 18,34 mg	Dor e inflamação localizadas do sistema musculoesquelético, como: torcicolo, tendinites (inflamação dos tendões), fadiga muscular, rigidez nos ombros e as decorrentes de traumatismos, como contusões, pancadas, torções, entorses. Mialgia (dor muscular), lombalgia (dos nas costas), artralgia (dor de artrite, dor nas articulações), nevralgia (dor aguda em um ou mais nervos).
Silimarina + racemetionina	A05B – Terapia biliar, lipotrópicos	Drágea	70 + 100 mg	Hepatoprotetor (proteção do fígado contra agressões de origem alimentar (dietas gordurosas, ingestão excessiva de bebidas alcoólicas), medicamentosa ou infecciosa.).
Simeticona	A03A – Fármacos para transtornos funcionais do trato gastrointestinal	Comprimido	150 mg	Acumulação de gases no trato digestivo, que causam sensação de inchaço, dor ou desconforto, distensão abdominal, eructação (arroto) e flatulência (gases intestinais).
		Comprimido mastigável	125 mg	

		Emulsão oral	150 mg/ml	
Sorbitol + laurilsulfato de sódio	A06A – Laxantes	Solução retal	714 + 7,7 mg/g	Constipação intestinal (prisão-de-ventre). Facilitar a evacuação em casos necessários, como no preparo do paciente para exames diagnósticos; antes ou após procedimentos cirúrgicos; e em pacientes acamados, portadores de hemorroidas ou fissuras anais.
Subgalato de bismuto + óxido de zinco	D02A – Emolientes e protetores de uso local	Gel dermatológico	1,5 + 45 mg/g	Dermatite de fraldas (assaduras, dermatite amoniacal). Brotoejas. Irritações da pele de pequena intensidade provocadas pelo vento ou exposição prolongada ao sol.
Subgalato de bismuto + óxido de zinco + iodeto de timol	D08A – Antissépticos e desinfetantes de uso local	Pó dermatológico	3,0 + 93,33 + 1,5 mg/g	Dermatite de fraldas (assaduras, dermatite amoniacal). Brotoejas. Desodorante e antiperspirante dos pés e axilas.
Sulfato de magnésio	A02A – Antiácidos	Pó para solução oral	176,5 mg/g	Azia (acidez e queimação estomacal). Constipação (prisão de ventre) ocasional.
Sulfato de neomicina	D06A – Antibióticos de uso local	Pomada dermatológica	5 mg/g	Infecções bacterianas da pele e mucosas, como impetigo e furúnculo. Eczemas e queimaduras infectados. Úlcera cutânea.
Sulfato de neomicina + bacitracina zíncica	D06A – Antibióticos de uso local	Pomada dermatológica	5 mg/g + 250 UI/g	Infecções bacterianas da pele e mucosas, como impetigo, ectima, furúnculo, carbúnculo (antraz); nas dobras de pele (intertrigo), parte externa da orelha e mucosa nasal. Eczemas, acne, queimaduras infectados. Úlcera cutânea. Profilaxia de infecções cutâneo-mucosas decorrentes de ferimentos cortantes (inclusive cirúrgicos).
Sulfato de neomicina + tartarato de bismuto e sódio + cloridrato de procaína	A01A – Preparações bucais	Suspensão de uso local	25 + 25 + 15 mg/ml	Aftas e outras inflamações da mucosa da boca.
Sulfato de neomicina + tartarato de bismuto	A01A – Preparações bucais	Suspensão de uso local	26 + 25 + 15 + 1 mg/ml	Aftas e outras inflamações da mucosa da boca.

e sódio + cloridrato de procaína + mentol				
Sulfato ferroso	A15 - Estimulantes do apetite	Solução oral	1,5 mg/ml	Estimulante do apetite. Estados de inapetência (perda da vontade de se alimentar).
	B03 – Antianêmicos	Comprimido revestido, drágea	190 mg	Anemias por deficiência de ferro.
		Solução oral	125 mg/ml	
		Xarope	50 mg/ml	
Sulfato ferroso + cloridrato de piridoxina + nicotinamida	B03 – Antianêmicos	Solução oral	9,95 + 0,33 + 0,66 mg/ml	Anemias por deficiência de ferro. Estimulante do apetite. Suplemento vitamínico. Estimulante cerebral.
Sulfeto de selênio	D01A – Antifúngicos de uso local	Xampu	25 mg/ml	Caspa. Dermatite seborréica. Pitiríase versicolor ( <i>tinea versicolor</i> , pano branco ou micose de praia) no couro cabeludo.
Tintura de <i>Plumeria lancifolia</i> + salicilato de sódio + extrato fluido de <i>Passiflora alata</i> + extrato fluido de casca de <i>Citrus aurantium</i> L.	G02C – Outros produtos ginecológicos	Solução oral	0,625 ml/15 ml + 400 mg/15 ml + 0,300 + 0,013 ml/15 mL.	Regulador do fluxo menstrual. Dismenorreias (cólicas menstruais) agudas ou crônicas. Perturbações da menopausa.
Tintura <i>Matricaria chamomilla</i> L + cloridrato de lidocaína + polidocanol	A01A – Preparações bucais	Gel de uso local	150 + 3,4 + 3,2 mg/g	Dor e prurido (coceira) comuns no surgimento da primeira dentição em crianças.
Tioconazol	D01A – Antifúngicos de uso local	Creme dermatológico	10 mg/g	Tinha dos pés ( <i>tinea pedis</i> , pé-de-atleta), tinha do corpo ( <i>tinea corporis</i> ), tinha da virilha ( <i>tinea cruris</i> , <i>tinea inguinalis</i> ), tinha da cabeça ( <i>tinea capitis</i> ). Pitiríase versicolor ( <i>tinea versicolor</i> , pano branco ou micose de praia).



				Infecções mistas por fungos e bactérias Gram-positivas.
Tirotricina + sulfato de hidroxiquinolina	R02A – Preparações para a garganta	Solução de uso local	0,3 + 10 mg/ml	Aftas e outras irritações da mucosa da boca. Dor de garganta.
Tirotricina + sulfato de hidroxiquinolina + benzocaína	R02A – Preparações para a garganta	Pastilha	1 + 0,7 + 5 mg	Aftas e outras irritações da mucosa da boca. Dor de garganta.
Tirotricina + sulfato de hidroxiquinolina + cloridrato de lidocaína	R02A – Preparações para a garganta	Solução de uso local spray	0,1 + 2 + 4 mg/ml	Aftas e outras irritações da mucosa da boca. Dor de garganta.
Tirotricina + sulfato de hidroxiquinolina + fluoreto de sódio	A01A – Preparações bucais	Gel dental	0,25 + 6,2 + 2,2 mg/g	Aftas e outras inflamações da mucosa da boca. Profilaxia da cárie.
Tribenosídeo + cloridrato de lidocaína	C05A – Agentes para tratamento de hemorroidas e fissuras anais de uso local	Creme retal	50 + 20 mg/g	Hemorroidas.
		Supositório	400 + 40 mg	
Ureia	D02A – Emolientes e protetores de uso local	Creme dermatológico	200 mg/g	Pele seca e áspera. Hiperqueratose (espessamento da pele), ictiose (ressecamento e descamação da pele), eczema e calosidade de mãos, cotovelos, joelhos e pés.

## ANEXO II

### LISTA DE MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO (LMIP)

#### Medicamentos Fitoterápicos

Espécie	Classe Terapêutica	Parte empregada	Indicações terapêuticas e informações complementares.
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Produtos com ação sobre o aparelho cardiovascular	Sementes	Alívio dos sintomas relacionados a inchaços nas pernas, veias varicosas, sensação de peso, dor, cansaço, coceira, tensão nas pernas e câimbras na panturrilha. Restrições: uso oral, uso adulto.

<i>Aloe ferox</i> + <i>Gentiana lutea</i>	Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico	Rizoma + folhas	Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral, uso adulto.
<i>Aloe vera</i>	Anti-inflamatórios. Cicatrizantes com ação anti-inflamatória.	Folhas	Cicatrizante, destinado ao tratamento de queimaduras térmicas leves. Anti-inflamatório. Auxiliar no tratamento dos sintomas das dispepsias funcionais e dos distúrbios gastrointestinais espásticos (uso oral, uso adulto). Anti-inflamatório (uso tópico, uso adulto)
<i>Arnica montana</i>	Produtos com ação na pele e mucosas	Capítulo floral	Alívio dos sintomas de equimoses, hematomas e contusões. Uso tópico, uso adulto.
<i>Atropa belladonna</i>	Antiespasmódicos e anticolinérgicos gastrointestinais	Folhas	Alívio dos sintomas de cólicas e espasmos gastrintestinais. Uso oral, uso adulto.
<i>Calendula officinalis</i>	Anti-inflamatórios. Cicatrizantes com ação anti-inflamatória.	Flores	Cicatrizante, destinado ao tratamento de queimaduras térmicas leves. Anti-inflamatório. Auxiliar no tratamento dos sintomas das dispepsias funcionais e dos distúrbios gastrointestinais espásticos (uso oral, uso adulto). Anti-inflamatório (uso tópico, uso adulto)
<i>Cassia fistula</i> + <i>Senna alexandrina</i>	Laxantes irritantes ou estimulantes	Fruto + folhas	Constipação ocasional. Uso adulto, uso oral.
<i>Centella asiatica</i>	Produtos com ação sobre o aparelho cardiovascular	Partes aéreas	Alívio dos sintomas relacionados a inchaços nas pernas, veias varicosas, sensação de peso, dor, cansaço, coceira, tensão nas pernas e câmbrias na panturrilha. Restrições: uso oral, uso adulto.
<i>Cinchona calisaya</i>	Estimulantes do apetite	Casca	Estimulante do apetite e para cansaço físico e mental. Uso oral, uso adulto.
<i>Cinnamomum zeylanicum</i> + <i>Caryophyllus aromaticus</i>	Outros produtos para o aparelho digestivo e metabolismo	-	Antiflatulento em casos de problemas digestivos. Uso oral. Uso adulto.
<i>Crataegus oxyacantha</i> + <i>Salix alba</i> + <i>Passiflora incarnata</i>	Ansiolíticos	Flores + casca + flores	Ansiolítico leve. Auxiliar no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Uso oral, uso adulto.

<i>Cynara scolymus</i>	Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico	Folhas	Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral, uso adulto.
<i>Cynara scolymus</i> + <i>Peumus boldus</i>	Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico	Folhas + folhas	Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral, uso adulto.
<i>Eucalyptus globulus</i>	Expectorantes	Folhas	Antisséptico das vias aéreas superiores e expectorante. Broncodilatador. Uso oral, uso adulto.
<i>Gentiana lutea</i> + <i>Chamaemelum nobile</i>	Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico	Rizoma + raiz	Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral, uso adulto.
<i>Glycine max</i>	Produtos para uso em ginecologia	Sementes	Auxiliar no alívio dos sintomas do climatério. Uso oral, uso adulto.
<i>Glycyrrhiza glabra</i>	Antiulcerosos	Raízes	Alívio dos sintomas digestivos incluindo queimação e dispepsia. Uso oral, uso adulto.
<i>Hamamelis virginiana</i>	Antihemorroidários tópicos e/ou terapia varicosa inclusive antihemorroidário	Folhas	Auxiliar no tratamento de hemorroidas externas e equimoses (uso tópico, uso adulto). Alívio do prurido e ardor associados a hemorroidas (uso oral, uso adulto).
<i>Harpagophytum procumbens</i>	Anti-inflamatórios ou antirreumáticos simples	Raízes secundárias	Alívio de dores articulares menores e dor lombar aguda. Uso oral, uso adulto.
<i>Matricaria chamomilla</i> + <i>Gentiana lutea</i> + <i>Nux vômica</i> + <i>Peumus boldus</i>	Antiespasmódico	Flores + rizoma e raízes + sementes + folhas	Auxiliar no tratamento dos sintomas das dispepsias. Uso oral. Uso adulto.
<i>Matricaria recutita</i>	Anti-inflamatórios. Cicatrizantes com ação anti-inflamatória.	Capítulos florais	Cicatrizante, destinado ao tratamento de queimaduras térmicas leves. Anti-inflamatório. Auxiliar no tratamento dos sintomas das dispepsias funcionais e dos distúrbios

			gastrointestinais espásticos (uso oral, uso adulto). Anti-inflamatório (uso tópico, uso adulto)
<i>Maytenus ilicifolia</i>	Antiulcerosos	Folhas	Alívio dos sintomas digestivos incluindo queimação e dispepsia. Uso oral, uso adulto.
<i>Maytenus ilicifolia</i> + <i>Jateoriza palmata</i>	Outros produtos para o aparelho digestivo e metabolismo	Folhas + raízes	Auxiliar no tratamento dos sintomas das dispepsias funcionais, principalmente na dor epigástrica. Uso oral. Uso adulto.
<i>Melissa officinalis</i>	Antiespasmódico, ansiolítico, cicatrizantes	Folhas	Antiflatulento (combate gases), antiespasmódico e ansiolítico leve. Uso oral, uso adulto.
<i>Mikania glomerata</i>	Expectorantes	Folhas	Antisséptico das vias aéreas superiores e expectorante. Broncodilatador. Uso oral, uso adulto.
<i>Mikania glomerata</i> + <i>Polygala senega</i> + <i>Cephaelis ipecacuanha</i>	Expectorantes	-	Antitussígeno, broncodilatador e expectorante. Uso oral. Uso adulto.
<i>Nasturtium officinale</i>	Expectorantes	Partes aéreas	Antisséptico das vias aéreas superiores e expectorante. Broncodilatador. Uso oral, uso adulto.
<i>Nasturtium officinale</i> + <i>Mikania glomerata</i> + <i>Polygala senega</i> + <i>Myroxylon balsamum</i> + <i>Cephaelis ipecacuanha</i> + <i>Aconitum napellus</i>	Expectorantes	-	Antitussígeno, broncodilatador e expectorante. Uso oral. Uso adulto.
<i>Operculina alata</i>	Laxantes irritantes ou estimulantes	Raiz	Laxativo, nos casos de constipação funcional aguda. Uso oral, uso adulto.
<i>Panax ginseng</i>	Neurotônico	Raiz	Para cansaço físico e mental. Uso oral, uso adulto.
<i>Passiflora alata</i> + <i>Erythrina mulungu</i> + <i>Crataegus oxycanta</i>	Ansiolíticos	Folhas + casca + flores e folhas	Ansiolítico leve. Auxiliar no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Uso oral, uso adulto.
<i>Passiflora incarnata</i>	Ansiolíticos	Partes aéreas	Ansiolítico leve. Auxiliar no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Uso oral, uso

			adulto.
<i>Passiflora incarnata</i> + <i>Crataegus oxyacanta</i> + <i>Salix alba</i>	Ansiolíticos	-	Ansiolítico leve. Auxiliar no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Uso oral, uso adulto.
<i>Paullinia cupana</i>	Neurotônico	Semente	Para cansaço físico e mental. Uso oral, uso adulto.
<i>Peumus boldus</i> (folhas)	Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico	Folhas	Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral, uso adulto.
<i>Peumus boldus</i> + <i>Rhamnus purshiana</i> + <i>Rheum palmatum</i>	Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico	Folha + casca + rizoma e raiz	Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral, uso adulto.
<i>Plantago ovata</i> (casca da semente)	Laxantes incrementadores do bolo intestinal	Casca da semente	Auxiliar no tratamento de constipação intestinal. Constipação ocasional. Uso oral, uso adulto.
<i>Plantago ovata</i> + <i>Senna alexandrina</i>	Laxantes incrementadores do bolo intestinal	Semente e casca da semente + Frutos	Auxiliar no tratamento de constipação intestinal. Constipação ocasional. Uso oral, uso adulto.
<i>Polygala senega</i> (raízes)	Produtos para o aparelho respiratório	Raízes	Auxiliar no tratamento dos sintomas da bronquite crônica e da faringite. Uso oral, uso adulto.
<i>Rhamnus purshiana</i>	Laxantes irritantes ou estimulantes	Casca	Constipação ocasional. Uso adulto, uso oral.
<i>Salix alba</i>	Analgésicos, anti-inflamatórios	Casca	Antitérmico, anti-inflamatório e analgésico. Uso adulto, uso oral.
<i>Senna alexandrina</i>	Laxantes irritantes ou estimulantes	Folhas e frutos	Constipação ocasional. Uso adulto, uso oral.
<i>Serenoa repens</i>	Produtos com ação no trato urinário	Frutos	Alívio dos sintomas do trato urinário baixo relacionados a hiperplasia prostática benigna

			depois que condições mais sérias tenham sido excluídas por um médico. Uso oral. Uso adulto.
<i>Silybum marianum</i>	Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico	Frutos sem papilho	Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral, uso adulto.
<i>Silybum marianum</i>	Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico	Frutos sem papilho	Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral, uso adulto.
<i>Solanum paniculatum</i> + <i>Peumus boldus</i>	Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico	-	Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral, uso adulto.
<i>Solidago microglossa</i>	Analgésicos, anti-inflamatórios	Partes aéreas	Anti-inflamatório nos casos de contusões, dores musculares e hematomas (uso tópico, uso adulto). Anti-inflamatório (uso oral, uso adulto).
<i>Symphytum officinale</i>	Analgésicos, anti-inflamatórios	Raiz	Alívio sintomático de entorses leves e contusões. Uso tópico. Uso adulto.
<i>Trichilia catiguá</i> + <i>Croton heliotropiifolius</i> + <i>Paullinia cupana</i>	Neurotônico	-	Para cansaço físico e mental. Uso oral, uso adulto.
<i>Uncaria tomentosa</i>	Analgésicos, anti-inflamatórios	Casca do caule e raiz	Anti-inflamatório. Uso oral. Uso adulto
<i>Vitis vinifera</i>	Produtos com ação sobre o aparelho cardiovascular	Folhas	Alívio dos sintomas relacionados a inchaços nas pernas, veias varicosas, sensação de peso, dor, cansaço, coceira, tensão nas pernas e câimbras na panturrilha. Restrições: uso oral, uso adulto.
<i>Zingiber officinale</i>	Antieméticos e anti-nauseantes	Rizomas	Profilaxia de náuseas causadas por movimento (cinetose) e pós-cirúrgicas. Uso oral. Uso adulto.